

Farrowsure® Plus B.

Præsentation:

Inaktiveret leptospirose-, rødsyge- og parvovirusvaccine til immunisering af raske svin.

Virkningsmekanismer/egenskaber:

Vaccinen indeholder hele cellekulturer af 6 *Leptospira* serovarer, porcint parvovirus dyrket på en kendt cellelinie samt en serumfri og oprenset *Erysipelothrix rhusiopathiae* kultur. Antigenerne er inaktiverede. For at forstærke det immunologiske respons er der tilsat to adjuvanser, hvoraf det ene er Amphigen®. Efter vaccination er grisene beskyttet mod rødsyge i 6 måneder.

Indikationer:

Vaccination af raske avlssvin som et middel til at forhindre reproduktionsproblemer forårsaget af *Leptospira bratislava*, *L. canicola*, *L. grippotyphosa*, *L. hardjo*, *L. icterohaemorrhagiae* og *L. pomona*, porcint parvovirus (PPV), samt rødsyge forårsaget af *E. rhusiopathiae*.

Bivirkninger:

Hævelse på injektionsstedet kan forekomme. Forbigående feber og nedstemthed er observeret inden for det første døgn efter vaccination.

Kontraindikationer:

Kun raske dyr bør vaccineres.

Bemærkninger:

Anafylaktiske reaktioner kan forekomme. Den beskyttende immunitet forringes, hvis dyrenes immunsystem er negativt påvirket (f. eks. pga. smitte med infektionssygdomme, parasitære sygdomme eller at dyrene er stressede).

Brugsvejledning:

Beholderen omrystes før brug. Sterile sprøjter og nåle anvendes. Efter anbrud bør al indholdet straks anvendes.

Vaccinationsprogram:

- Dosis: 5 ml IM.
- Grisene vaccineres 2 gange med 3-5 ugers mellemrum, således at 2. vaccination gives 2-4 uger før løbning. (Hos polte gives 2. vaccination så tæt på 14 dage før løbning som muligt).
- Revaccination: En enkelt dosis før hver løbning.
- Orner vaccineres halvårligt.

Opbevaring:

Opbevares frostfrit ved 2-7° C.

Udlevering:

Kan rekvireres fra DFVF på tilladelse.

Pakninger:

Hætteglas indeholdende 10 doser.

