

## **FUS (FLUTD) hos kat**

Hermed menes en tilstand af dysuri/anuri, primært hos hankatte, forårsaget af blokering af urethra. Patienten er oftest en akut patient.

Grad af urinstase og tilstandens varighed vurderes ud fra anamnesen. Graden af udspiling af blæren vurderes ved palpation.

Almentilstand og kredsløbet, herunder hydreringsgrad, vurderes med henblik på sedering/narkotisering. Blodprøve udtages og undersøges for urea og hæmatokrit eventuelt mm.

Sedering/narkose: Domitor og Ketaminol eller Zoletil. (Se manual for sedering og anæstesering)

Initialt forsøger man at fjerne obstruktionen ved massage af urethra, samtidig med at man lægger et let tryk på blæren. Kan passage ikke etableres foretages cystocentese med tømning af blæren for urin, der opsamles til analyse.

Efterfølgende forsøges skyldning af urethra med blødt kateter eller tårekanalskanyle. Kan dette ikke fjerne obstruktionen, anvendes vibrator til montering på tandrenser.

Når passage er etableret, skylles med rigelige mængder isoton saltvand, indtil synlige stendannelser ikke kan erkendes i skyllevæsken.

Blærens tykkelse og dermed tilstand vurderes med henblik på, om kateter bør ligge i blæren i 2 – 3 dage. Såfremt dette besluttet, fastsutures kateteret og katten indlægges i denne periode.

Katten behandles med antibiotika, romefen og væske efter behov.

Urinundersøgelse: Stix, mikroskopi af sediment (celler og krystaller), BU og resistensundersøgelse.

Som yderligere diagnostisk undersøgelse kan røntgen og/eller skanning overvejes.

Rådgivning af klienten om videre behandling og forebyggelse (foder) afgøres ud fra laboratoriesvar mm.