

Symptomer: Typisk halthed på et bagben og forandring på det mest almindelige sted klovspaltens plantare del, er dyret tilbøjelig til at stå på spidsen af kloven grundet smerte. Ingen hævelse som ved klovbrandbyld.

Diagnose: Løft benet op, gøre rent og undersøg hele klovspalten også klovspaltens overgang til huden på benets dorsalside

De tidligste forandringer består af ulcerationer, typisk på hver side af klovspalten. Senere i forløbet ses de typiske jordbærlignende forandringer. Karakteristisk ses uden om forandringen en hvid zone, og hårene udenom stikker tydeligt frem. Ulcerationerne kan blive til dybe, blødende kratere eller gå over i en proliferativ fase og farven bliver efterhånden mere gråbrunlig og der kan dannes lange hårligende gevækster.

Behandling: Rengøring i klovspalten. På noget tyndt vat, som formes efter læsionens udbredelse påføres tetracyclin ex Terremycin og vattet klemmes op mod læsionen. En klovspalteforbinding (Kruuses de gule) sættes på og fjernes først efter 4-5 dage. Denne metode er ikke umiddelbart lovlig.

Forebyggelse er vigtigt

Hygiejne i båsene samt bag ved

Underlag skal være tørt

Ventilation skal være optimal

Smittebeskyttelse da DD kan overføres via indkøbte dyr, redskaber, støvler etc

Andre klovlidelser ex balleforrådnelse disponerer for DD

Fodbad skal være konstrueret rigtigt og holdes rent. Blåsten i en 5% opløsning,