

August 2001

Oplæg til goldningsprocedure og rådgivning heri:

Forudsætningen for en god laktation med høj produktion og sundhed samt reproduktion er goldperioden.

Goldkommanagement starter 2 måneder før køerne skal goldes.

Køerne skal goldes af i samme huld som de ønskes at kælv i (3,5).

Da energiomsætningen hos koen er mest effektiv under laktationen, er det mens koen stadig giver mælk, at man skal øge dens vægt og et evt vægttab skal opnås inden goldning, da køerne ikke må tabe sig i goldperioden

En styring af af goldningstidspunktet har stor indflydelse på ydelse og sundhed i den efterfølgende laktation

Gold efter huld og ydelse:

Huld $\geq$ 3,75	Ydelse rimelig/god Ydelse lav	foderreduktion foderreduktion	goldes ca 50 dage før kælvning goldes nu
Huld $\leq$ 3	Ydelse rimelig/god  ydelse meget lav	foderniveau bi- beholdes  foderreduktion	goldes ca 70 dage før kælvning  goldes nu, foderniveau hæves når mælken er væk

Husk

- når man holder op med at malke koen går der som regel 3 uger før mælken i alveolerne er absorberet
- de sidste 2 uger før kælvning bruges til at forberede og danne råmælk
- mellemliggende periode reguleres alveoler og kirtler.

Der skal udarbejdes en egentlig goldfoderplan.

Anvendes fuldfoder bør man ikke anvende den samme blanding som til lakterende køer – dette kan give goldkøerne fedme etc

De ældre goldkøer bør fodres som køerne i den sidste uge af goldperioden.

Yngre goldkøer og kvier bør starte produktionsfodringen 2-3 uger inden kælvning.

Koniveau.

Den enkelte ko skal vurderes før goldning 1) yverpalpation – for bla induration i yveret, 2) celletal aktuel samt i den forgangne laktation, 3) evt CMT-test, bakteriologi

Ved mistanke/påvisning af skjult infektion foretages en forebyggende goldyverbehandling med egnet antibiotika ex Orbenin

Regelmæssig pattedybning