

# Ketose

**Symptomer:** 1) Nedsat foderoptagelse – især kraftfoder  
2) Tør gødning  
3) Høj fedtprocent i mælken

**Diagnose:** Ketostic, Ketolac (værdier >2)

**Behandling:** CalcijectPMD + Dexadreson + Recovin ketosepasta/propylenglykol 300 ml i 4 dage.

**Forebyggelse:** Følgende forhold er disponerende for ketose:

- 1) huldtab i goldperioden
- 2) fede køer ved kælvning (kan ikke dokumenteres ved kvier)
- 3) lang goldperiode for ældre køer
- 4) utilstrækkelig optagelse af energi, ex.:
  - a) mangelfuld optrapning med energi før kælvning
  - b) energisvag foderration efter kælvning
  - c) bratte foderskift omkring kælvning
  - d) fødselskomplikationer
  - e) mælkefeber
  - f) infektionssygdomme (metritis, mastitis m.v.)
  - g) fodring med ketogene fodermidler (sukker)
- 5) Risikokøer (fede) kan tildeles propylenklykol 300 ml/dag 3 dage ap – 3 dage pp

**Overvågning:** Alle nykælvere (0-30 dage pp) testes med Ketostic/Ketolac

**Motivering:** Et ketose tilfælde (synlig eller ikke synlig) koster ca. 1500 kr.